



división agrícola

EASY ZINC 70

FERTILIZANTE FOLIAR

PRODUCTS EASY KLEEN SA DE CV

Amada Armendáriz # 279

Col. Revolución, Cp: 31135

Chihuahua, Chih, Mx.

☎ 614. 421.9815

✉ contacto@easykleen.com.mx

🌐 www.easykleen.com.mx



EASY ZINC 70

FERTILIZANTE FOLIAR

Es un fertilizante foliar de alta concentración, formulado para ser aplicado en las fases fenológicas críticas para la prevención o corrección de la deficiencia de zinc en cultivos hortícolas, frutales y cereales.

El Zinc es un elemento esencial en la actividad de procesos metabólicos para el desarrollo de la raíz, brotes ya que es un activador de la síntesis de auxinas.



La aplicación foliar de **EASY ZINC 70** hace que la concentración de Zinc en la planta se mantenga en el nivel adecuado.



Formulado a base de ZnO de alta concentración, 650gr/L. Dirigido a la corrección de deficiencias y mejora en el desarrollo de brotes y raíces.



EASY ZINC 70, es de un sencillo manejo, dado que su formulación es de fácil mezcla y dispersión en el tanque de aplicación, sin tener que realizar una pre-mezcla.

APLICACIÓN

EASY ZINC 70

Cultivos	Dosis L/ha	Época de aplicación
Algodón	0.5 1 - 2	- Entre la 3 a 5 hoja verdadera - Antes de la formación de yemas florales
Tomate y chile	0.5 - 1	- 15 días después del trasplante. - Repetir cada 15 días durante el desarrollo vegetativo. - Hasta antes de la floración.
Maíz y trigo	1 - 2	- 1ª. Entre la 3 a 4 hoja verdadera. - 2ª. De la 6 a 8 hoja verdadera.
Melón, sandía y pepino	1 - 2	- 1ª. 10 a 15 días después de nacer o trasplante. - 2ª. 10 días después de la primera aplicación. - 3ª. Al inicio de fructificación. Repetir cuando se presenten deficiencias.
Vid (Mesa y vinífera)	1.5 - 2.5	- Efectuar 2 aplicaciones: - 1ª. a 20 días antes de inicio de floración y la 2ª 15 días después.

Cultivos	Dosis L/ha	Época de aplicación
Peral y manzano	0.5 - 1 1 - 1.5 1 - 2	- 1ª. Al inicio de brotación y/o desarrollo de nuevas hojas. - 2ª. 4 semanas después de floración. - 3ª. 20 - 30 días antes de caída de hojas (post cosecha).
Cebolla y ajo	0.5 - 1	- 1ª. 20 días después del trasplante. - 2ª. 10 días después. - 3ª. Al inicio del desarrollo del bulbo.
Nogal	0.5 0.75	- 1. Al inicio de brotación y repetir a los 10 y 20 días después de brotación. - Aplicar después de amarre y hasta endurecimiento de la cascara.
Papa	1	- Aplicar 15-20 días después de 100% de emergido el cultivo. - En caso de deficiencia leve repetir a los 20 días.
Durazno	1- 2 0.5 1-3	- Aplicar en la yema hinchada y repetir en botón floral. - Desde cuajado, cada 2-3 semanas hasta 1 mes antes de cosecha. - En post-cosecha antes de la caída de hojas.

EASY ZINC 70

FERTILIZANTE FOLIAR



FITOTOXICIDAD:

EASY ZINC 70, no es fitotóxico en los cultivos y las dosis aquí recomendadas. Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo es conveniente hacer una prueba antes de hacer la mezcla definitiva.

Es un producto de rápida eficiencia y persistencia en temporada de lluvias que en su presentación de suspensión concentrada ayuda a mejorar el desarrollo de brotes y raíces.

Zinc ayuda a los sistemas de defensa de la planta, aumentando la tolerancia a causantes de estrés.

- ★ Aumenta la viabilidad del polen
- ★ Aumenta el color verde de las hojas

