



división agrícola **FRUTIDERM**

DESINFECTANTE, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

PRODUCTS EASY KLEEN SA DE CV

Amada Armendáriz # 279

Col. Revolución, Cp: 31135

Chihuahua, Chih, Mx.

☎ 614. 421.9815

✉ contacto@easykleen.com.mx

🌐 www.easykleen.com.mx



FRUTIDERM

DESINFECTANTE, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

Es un efectivo Desinfectante/Microbicida de amplio espectro en la prevención de enfermedades radicales y desinfección de invernaderos. La formulación de **FRUTIDERM** presenta un alto contenido de yodo molecular.

VENTAJAS

- * Activador fisiológico de la planta.
- * Mejora la absorción de nutrientes.
- * Activador de mecanismos de defensa de la planta.
- * Efectivo en la desinfección de herramientas, charolas, equipos de trasplante y trabajo tanto en invernaderos como de campo abierto.
- * Reduce el riesgo de infección y la diseminación de patógenos.
- * No genera resistencia, por lo que puede ser aplicado en forma consecutiva sin riesgo.
- * Actúa aún en presencia de materia orgánica.
- * No es afectada su actividad en aguas duras.



MODO DE ACCIÓN

Además del efecto oxidativo de la pared celular de los microorganismos por el yodo molecular, se genera hipoyodito y ácido hipoyodoso el cual ocasiona la desnaturalización de las proteínas fúngicas y precipitado de los ácidos nucleicos de las bacterias.

Evita la diseminación de focos infecciosos y favorece la brotación de brotes sanos.




APLICACIÓN

FRUTIDERM



Cultivos	Dosis	Época de aplicación
Manzano	2 L/ha	- Vía foliar después de cosecha antes de caída de hojas.
	5 L/ha	- Vía riego después de cosecha.
	3 L/ha	- Aspersión antes y después de poda dirigida al tronco y ramas.
	2 L/ha	- Vía foliar en punta verde, punta rosa y después de caída de pétalos.
	2 L/ha	- Vía foliar al inicio de síntomas de fungosis o bacteriosis.
Algodón	3 L/ha	- Vía Riego en la 3a a la 5a hoja.
	2 L/ha	- Vía Foliar al cuadro y cuando se presenten síntomas de fungosis o bacteriosis.
Chiles Tomates	1 L/ha	- Al trasplante vía riego.
	2 L/ha	- Vía foliar al inicio de síntomas de fungosis o bacteriosis.
	3 L/ha	- Vía riego antes de la época de lluvias y/o durante lluvia.
Cebollas Ajo	1.5 L/ha	- Vía riego antes o en el trasplante.
	3 L/ha	- Vía riego antes y después de la época de lluvias.

Cultivos	Dosis	Época de aplicación
Melón Sandías	1.2 L/ha	- Al trasplante vía riego.
	2 L/ha	- Vía foliar al inicio de síntomas de fungosis o bacteriosis.
	2 L/ha	- Vía riego antes de la época de lluvias y/o durante lluvia.
Papa	3 L/ha	- Siembra vía sistema de riego.
	2 L/ha	- Refuerzo 25 - 30 días después.
	2 L/ha	- Segundo refuerzo 25-30 días después.
	150 mL/ton	- Tratamiento a semilla.



FRUTIDERM

DESINFECTANTE, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

No causa irritación en la piel de las personas que lo manipulan, **FRUTIDERM** no tiene efectos corrosivos en las líneas de riego. **FRUTIDERM** no es fitotóxico, es un excelente aliado en el buen desarrollo de tus cultivos.

Su fórmula en base a yodóforos forma una mezcla con gran actividad germicida, actúa en presencia de materia orgánica y no se ve afectado por agua dura.

INCOMPATIBILIDAD: **FRUTIDERM**, es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas usados en la agricultura, sin embargo es recomendable realizar pruebas compatibilidad y de preferencia aplicarlo solo. Para una máxima asimilación se recomienda ajustar el PH del agua de 5.5 a 6.5.

